

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI INFERNIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

- 1. L'indice di massa corporea (BMI) è uno strumento utilizzato in ambito infermieristico per la valutazione del rischio di:**

 - a) obesità
 - b) caduta
 - c) alterazione dello stato di coscienza
- 2. Secondo quale riferimento normativo l'infermiere pediatrico è responsabile dell'erogazione dell'assistenza infermieristica in ambito pediatrico?**

 - a) D.M. 739/1994
 - b) D.M. 70/1997
 - c) D.M. 740/1994
- 3. Quale dei seguenti muscoli è coinvolto nella respirazione:**

 - a) quadricipite
 - b) deltoide
 - c) diaframma
- 4. La frizione delle mani con un prodotto a base alcolica:**

 - a) è indicata quando le mani sono visibilmente sporche o imbrattate di sangue
 - b) favorisce l'aderenza alle corrette pratiche di igiene delle mani e non necessita di particolari infrastrutture (rete idrica, lavandino)
 - c) non presenta alcun vantaggio rispetto al lavaggio delle mani con acqua e sapone
- 5. Quali aree anatomiche presentano il maggior rischio di sviluppare lesioni da pressione nel paziente posizionato in decubito prono?**

 - a) Dorso del piede e caviglia, ginocchia, guance, orecchio
 - b) Malleolo, orecchio, parte laterale della spalla
 - c) Talloni, sacro, gomiti, scapole, nuca
- 6. Quali alimenti sono indicati per soddisfare il bisogno di alimentazione in un paziente che segue una dieta ricca di fibre?**

 - a) Mirtilli
 - b) Biscotti integrali e legumi
 - c) Cioccolato, cacao
- 7. Quale delle seguenti prestazioni rientra nelle competenze operative dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS) nell'ambito dell'assistenza di base?**
- a) cooperare alla rilevazione delle abitudini di vita e alle condizioni rischio-danno dell'utente**
- b) Pianificare l'intervento assistenziale in riferimento alle Diagnosi Infermieristiche**
- c) Pianificare l'intervento assistenziale in riferimento ai Problemi Collaborativi**
- 8. Che cosa si intende, in ambito clinico-infermieristico, con il termine glicemia?**

 - a) il processo di degradazione del glucosio
 - b) il valore di glucosio presente nelle urine
 - c) il valore della concentrazione di glucosio a livello ematico
- 9. Quali caratteristiche cliniche permettono di identificare l'alterazione della funzione intestinale definita stipsi?**

 - a) Emissione frequente di fuci liquide
 - b) Evacuazione con sforzo di fuci dure e asciutte e riduzione della frequenza delle scariche
 - c) Emissione frequente con fuci striate di sangue
- 10. Si hanno a disposizione compresse da 500 mg l'una. In caso di prescrizione medica pari a 250 mg, quante compresse devono essere somministrate.?**

 - a) mezza
 - b) 3 compresse
 - c) 1 compressa + mezza
- 11. Quali fattori ambientali possono incidere sul soddisfacimento del bisogno di sonno e di riposo?**

 - a) Patologie respiratorie e stato emotivo
 - b) Patologie a carico del sistema circolatorio
 - c) illuminazione, rumori intermittenti
- 12. Nel paziente con grave politrauma cosa è necessario valutare con priorità:**

 - a) Ristagno gastrico
 - b) diuresi oraria
 - c) pervietà delle vie aeree
- 13. Un paziente deve subire un intervento chirurgico d'urgenza: quali tra i seguenti interventi infermieristici devono essere effettuati con priorità:**

 - a) identificare il paziente, posizionare un catetere venoso periferico ed effettuare i prelievi ematici

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI INFERNIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

- b) identificare il paziente e somministrare la terapia per os
c) somministrare liquidi chiari
- 14. La scala di Glasgow rileva:**
a) pressione venosa
b) stato di coscienza
c) pressione arteriosa
- 15. Quali interventi assistenziali risultano prioritari per la prevenzione delle lesioni da pressione?**
a) mantenere la cute pulita e asciutta
b) effettuare massaggi a base di alcol saponato
c) effettuare delle applicazioni caldo-umide
- 16. La somministrazione di farmaci per via enterale avviene attraverso il:**
a) sistema circolatorio
b) sistema cutaneo e sottocutaneo
c) tratto gastro-intestinale
- 17. L'utilizzo dei guanti è una misura:**
a) alternativa all'igiene delle mani con soluzione alcolica
b) alternativa al lavaggio chirurgico delle mani
c) aggiuntiva al lavaggio delle mani
- 18. La ritenzione urinaria consiste in:**
a) presenza di sangue nelle urine
b) mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica
c) sensazione di bruciore durante la minzione
- 19. Che cosa si intende per "tachipnea"?**
a) diminuzione della frequenza degli atti respiratori, meno di 10 atti respiratori/minuto.
b) Una difficoltà respiratoria, con ritmo irregolare
c) aumento della frequenza respiratoria, oltre 20 atti respiratori/minuto
- 20. IL digiuno è una condizione adottata nel caso di prelievo ematico:**
a) Sì, sempre
b) No, mai
c) Dipende dalla tipologia di esame da indagare
- 21. Che cosa si intende, in ambito assistenziale, per tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003 - GDPR (Regolamento UE 2016/679) del paziente?**
a) Protezione delle informazioni personali e dei dati sensibili del paziente
- b) Possibilità per i familiari di accedere liberamente alla documentazione clinica
c) Condivisione dei dati sanitari con altri pazienti per favorire il confronto
- 22. Il Codice Deontologico delle professioni infermieristiche :**
a) Stabilisce la sequenza delle procedure assistenziali
b) Norma i termini dell'anticorruzione nei comportamenti professionali a rischio
c) Guida l'agire professionale mediante valori etici
- 23. Quali aspetti devono essere valutati prioritariamente nell'assistenza a un lattante con iperpiressia?**
a) Capacità di alimentarsi autonomamente con cibi solidi
b) Stato di idratazione, frequenza respiratoria e livello di reattività
c) Capacità di assumere liquidi freddi
- 24. Quale posizione favorisce la ventilazione in un paziente che presenta difficoltà respiratoria?**
a) Decubito prono obbligatorio
b) Posizione di Trendelenburg
c) Posizione seduta o semi-Fowler
- 25. Quale segno clinico può indicare un peggioramento neurologico in un paziente con trauma cranico?**
a) Diminuzione del livello di coscienza o letargia
b) Linguaggio fluido e coerente
c) Rush cutaneo diffuso
- 26. Quale segno indica un possibile coinvolgimento respiratorio in un quadro di anafilassi?**
a) Tosse catarrale
b) Diarrea
c) Stridore o difficoltà respiratoria
- 27. Quale segno può indicare un peggioramento della malattia infiammatoria intestinale?**
a) Aumento della frequenza delle scariche diarroiche con presenza di sangue
b) Assenza di dolore addominale
c) Riduzione della peristalsi senza altri sintomi

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI INFERNIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

28. Quali interventi fondamentali devono essere attuati durante le manovre di primo soccorso?

- a) Rilevare parametri vitali
- b) Mobilizzare il paziente indipendentemente da potenziali traumi
- c) Valutazione dello stato di coscienza e del respiro

29. Quale intervento assistenziale è prioritario durante una crisi convulsiva?

- a) Inserire oggetti in bocca per evitare il morso della lingua
- b) Proteggere il capo del paziente e mantenere l'area circostante sicura
- c) Bloccare i movimenti del paziente e poi sollevare il paziente in posizione seduta

30. Gli anticorpi monoclonali (mAB) somministrati al neonato, in ospedale o tramite il pediatra, durante il primo anno di vita attivano una immunizzazione passiva per la prevenzione di quale malattia respiratoria:

- a) Bronchiolite da RSV
- b) Polmonite da Klebsiella
- c) Asma bronchiale da Micoplasma

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI INFERNIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

- 1. L'indice di massa corporea (BMI) consente di identificare il rischio di:**
 - a) alterazione dello stato di coscienza
 - b) lesioni da pressione
 - c) obesità
- 2. Secondo quale norma l'infermiere pediatrico è "responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica":**
 - a) D.M. 739/1994
 - b) D.M. 740/1995
 - c) D.M. 70/1997
- 3. Quale dei seguenti muscoli è coinvolto nella deambulazione:**
 - a) quadricipite femorale
 - b) deltoide
 - c) diaframma
- 4. L'OMS promuove la frizione delle mani con un prodotto a base alcolica:**
 - a) prima e dopo il contatto con il paziente, prima di una procedura aseptica, dopo esposizione ai liquidi, dopo contatto con le superfici
 - b) solo dopo l'esposizione ai liquidi corporei
 - c) non presenta alcun vantaggio rispetto al lavaggio delle mani con acqua e sapone
- 5. In riferimento al regime alimentare indicato nei pazienti con Celiachia, quali alimenti sono inclusi:**
 - a) alimenti privi di glutine
 - b) alimenti privi di lattosio
 - c) alimenti privi di glucosio
- 6. Quale tra le seguenti attività è di competenza dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS):**
 - a) pianificare l'intervento assistenziale in riferimento alle Diagnosi Infermieristiche
 - b) cooperare alla rilevazione delle abitudini di vita e alle condizioni rischio-danno dell'utente
 - c) pianificare l'intervento assistenziale in riferimento ai Problemi Collaborativi
- 7. Nel paziente con esordio di Diabete cosa è necessario valutare con priorità:**
 - a) parametri vitali e glicemia
 - b) frequenza dell'alvo
 - c) pervietà delle vie aeree
- 8. Quali manifestazioni cliniche consentono di riconoscere l'alterazione della funzione intestinale definita stipsi?**

- a) Difficoltà nell'evacuazione con fuci dure o poco frequenti**
- b) Emissione di fuci liquide più volte al giorno**
- c) Dolore addominale associato esclusivamente a meteorismo**
- 9. Quali tra le seguenti vaccinazioni sono raccomandate per i nuovi nati:**
 - a) anti-difterica
 - b) anti-tetanica
 - c) anti-meningococcica B
- 10. Qual è il significato e il ruolo del Codice Deontologico nella pratica professionale infermieristica?**
 - a) Definisce principi e valori etici-assistenziali
 - b) Indica le mansioni amministrative
 - c) Determina gli orari di lavoro e le turnazioni del personale
- 11. Un paziente deve subire un intervento chirurgico d'urgenza: quali tra i seguenti interventi infermieristici devono essere effettuati con priorità:**
 - a) somministrare terapia per via parenterale
 - b) identificare il paziente e somministrare la terapia per via orale
 - c) identificare il paziente, posizionare un catetere venoso periferico ed effettuare i prelievi ematici
- 12. La scala di Wong-Baker rileva:**
 - a) pressione venosa
 - b) dolore nei bambini di età >36 mesi
 - c) pressione arteriosa
- 13. Per prevenire la lesione da pressione è necessario:**
 - a) Effettuare regolari cambi posturali e valutare l'integrità cutanea
 - b) Lasciare il paziente nella stessa posizione per evitare disturbi
 - c) Limitare l'idratazione per ridurre la diuresi
- 14. La somministrazione di farmaci per via parenterale avviene attraverso:**
 - a) sistema circolatorio
 - b) cute
 - c) tratto gastro-intestinale
- 15. L'utilizzo dei guanti è una misura:**
 - a) alternativa all'igiene delle mani con soluzione alcolica
 - b) alternativa al lavaggio chirurgico delle mani

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI INFERNIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

- c) aggiuntiva al lavaggio delle mani
- 16. Che cosa si intende per "brachicardia"?**
- a) aumento della frequenza cardiaca, con ritmo regolare
 - b) difficoltà respiratoria, con ritmo irregolare
 - c) diminuzione della frequenza cardiaca, con battiti più lenti al range di riferimento per età
- 17. Quale intervento infermieristico è corretto durante la somministrazione di alimenti tramite gavage?**
- a) Mantenere il paziente con il tronco sollevato, avendo controllato la presenza di ristagno gastrico
 - b) Posizionare il paziente completamente supino
 - c) Somministrare la miscela molto rapidamente
- 18. Quali segni indicano un peggioramento del distress respiratorio?**
- a) Saturazione di ossigeno
 - b) Temperatura corporea e Pressione arteriosa una volta al giorno
 - c) Diuresi nelle 24 ore
- 19. Che cosa si intende per tutela della privacy del paziente (D.Lgs. 196/2003 -GDPR (Regolamento UE 2016/679))?**
- a) Pubblicazione dei risultati degli esami per garantire trasparenza
 - b) Comunicazione delle condizioni cliniche a chiunque ne faccia richiesta
 - c) Protezione delle informazioni personali e dei dati sensibili del paziente
- 20. Quali aspetti devono essere valutati prioritariamente nell'assistenza a un lattante con iperpiressia?**
- a) Offrire più frequentemente latte o soluzioni reidratanti orali
 - b) D. Evitare qualsiasi alimentazione fino alla scomparsa della febbre
 - c) E. Aumentare la temperatura ambientale o mantenere il bambino ben coperto
- 21. Quale intervento assistenziale è prioritario in caso di sospetta anafilassi?**
- a) Valutare vie aeree, respiro e circolo
 - b) Somministrare acqua per via orale
- c) Posizionare il paziente in ortostatismo per migliorare la ventilazione
- 22. Quali aspetti clinici e assistenziali devono essere valutati in un paziente con malattia infiammatoria intestinale?**
- a) Frequenza delle evacuazioni, presenza di dolore addominale e stato di idratazione
 - b) Preferenze alimentari senza considerare i sintomi
 - c) Insonnia e crampi arti inferiori
- 23. Quale comportamento è corretto in presenza di un sospetto trauma?**
- a) Evitare di muovere il paziente se non strettamente necessario
 - b) Sollevare il paziente per farlo sedere e subito incoraggiarlo a camminare
 - c) Ruotare il capo ripetutamente
- 24. In quale momento assistenziale del post partum viene effettuata la valutazione con punteggio di Apgar?**
- a) Al 1° e al 5° minuto di vita
 - b) Solo dopo 24 ore dalla nascita
 - c) Prima del taglio del cordone ombelicale
- 25. Quale vaccino protegge i neonati da infezioni respiratorie gravi soprattutto nel primo anno di vita, tramite somministrazione materna (tra la 24^a e la 36^a settimana di gravidanza)?**
- a) RSV
 - b) HPV
 - c) HIV
- 26. L'età neonatale include:**
- a) i primi 28 giorni di vita
 - b) le prime 48 ore di vita
 - c) la prima settimana di vita
- 27. Quali parametri devono essere valutati con priorità nell'assistenza al paziente con grave politrauma?**
- a) Stato delle vie aeree, respirazione e circolazione
 - b) Temperatura corporea e livello di idratazione

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI INFERNIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

- c) Presenza di dolore localizzato agli arti
- 28. Quale condotta descritta anche nel “Codice di comportamento del dipendente”, costituisce violazione della Legge 190/2012 :**
- a) azioni che determinano conflitto di interesse
 - b) mancato rispetto dell’orario di lavoro
 - c) esprimere giudizi e pregiudizi verso l’assistito
- 29. Si hanno a disposizione fiale da 80 mg/2 ml l’una. In caso di prescrizione medica pari a 120 mg, quante ml devono essere somministrati?**
- a) 1 ml
 - b) 3 ml
 - c) 5 ml
- 30. I fattori ambientali che possono influenzare la soddisfazione del bisogno di sonno e riposo sono:**
- a) Patologie respiratorie e stato emotivo
 - b) Patologie a carico del sistema circolatorio
 - c) Illuminazione, rumori intermittenti, temperatura

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO ED IN-
DETERMINATO DI INFERNIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUN-
ZIONARI**

- 1. In cosa consiste la ritenzione urinaria?**
 - a) Incapacità completa o parziale di svuotare la vescica
 - b) Emissione frequente di urine in piccole quantità (stranguria)
 - c) Riduzione del volume urinario
- 2. Come viene definita, in ambito clinico-infermieristico, la tachipnea?**
 - a) Riduzione della profondità degli atti respiratori
 - b) Difficoltà respiratoria associata a dolore toracico
 - c) Aumento della frequenza respiratoria oltre 20 atti respiratori/minuto
- 3. In quali situazioni cliniche il digiuno viene richiesto prima dell'esecuzione di un prelievo ematico?**
 - a) Quando devono essere valutati parametri metabolici come glicemia e profilo lipidico
 - b) Solo in caso di emocromo completo
 - c) Per qualsiasi tipo di esame ematico
- 4. Quali segni possono indicare un peggioramento clinico in un lattante che presenta $TC > 38,5^{\circ} C$?**
 - a) Letargia, irritabilità marcata e ridotta assunzione di liquidi
 - b) Sudorazione lieve dopo la febbre
 - c) Pianto consolabile e vivace
- 5. Qual è l'obiettivo assistenziale della frizione delle mani con soluzione alcolica?**
 - a) Ridurre la carica microbica presente sulla cute
 - b) Eliminare lo sporco visibile dalle mani
 - c) Sostituire l'uso dei guanti sterili
- 6. Attraverso quale dispositivo avviene la somministrazione di farmaci per via enterale?**
 - a) Catetere venoso periferico
 - b) Sonda naso-gastrica o gastrostomia
 - c) Accesso venoso centrale
- 7. Quali sono le zone del corpo a maggior rischio di insorgenza delle lesioni da pressione nel decubito supino?**
 - a) Dorso del piede e caviglia, ginocchia, guance, orecchio
 - b) Malleolo, orecchio, parte laterale della spalla
 - c) Talloni, sacro, gomiti, scapole, nuca
- 8. In riferimento al bisogno di alimentazione nella dieta priva di lattosio quali cibi è consentito consumare?**
 - a) Latte, formaggi, yogurt
 - b) uova, carne, pesce
 - c) panna, burro
- 9. Quale tra le seguenti attività è di competenza dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS):**
 - a) cooperare alla rilevazione delle abitudini di vita e alle condizioni rischio-danno dell'utente
 - b) Pianificare l'intervento assistenziale in riferimento alle Diagnosi Infermieristiche
 - c) Pianificare l'intervento assistenziale in riferimento ai Problemi Collaborativi
- 10. Per glicosuria si intende:**
 - a) presenza di glucosio nelle feci
 - b) presenza di glucosio nelle urine
 - c) il valore della concentrazione di glucosio a livello ematico
- 11. Quali sono gli elementi che caratterizzano l'alterazione della funzione intestinale denominata diarrea?**
 - a) Emissione frequente di feci liquide o semiliquide
 - b) Evacuazione con sforzo di feci dure e asciutte e riduzione della frequenza delle scariche
 - c) Emissione frequente di feci striate di sangue
- 12. Si hanno a disposizione compresse da 500 mg l'una. In caso di prescrizione medica pari a 1000 mg, quante compresse devono essere somministrate.?**
 - a) mezza compressa
 - b) una compressa + mezza
 - c) due compresse

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO ED IN-
DETERMINATO DI INFERNIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUN-
ZIONARI**

13. Nel paziente con grave disidratazione cosa è necessario valutare con priorità:

- a) ristagno gastrico ed eruzioni cutanee
- b) alterazione coscienza, FC, FR, diuresi
- c) pervietà delle vie aeree

14. Quali interventi infermieristici devono essere effettuati con priorità in un paziente che deve essere sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza?

- a) Valutazione dei parametri e stabilizzazione delle funzioni vitali
- b) Praticare tricotomia
- c) Somministrazione liquidi per via orale

15. La scala di Bristol rileva:

- a) pressione venosa
- b) consistenza delle feci
- c) rischio cadute

16. Quali interventi assistenziali risultano prioritari per la prevenzione delle lesioni da pressione?

- a) Monitorare bilancio idrico
- b) Rilevare parametri vitali orari
- c) Cambiare frequentemente la posizione del paziente e utilizzare superfici antidecubito

17. La somministrazione di farmaci per via inalatoria avviene attraverso il:

- a) sistema respiratorio
- b) sistema cutaneo e sottocutaneo
- c) tratto gastro-intestinale

18. L'utilizzo dei guanti è una misura:

- a) alternativa all'igiene delle mani con soluzione alcolica
- b) alternativa al lavaggio chirurgico delle mani
- c) aggiuntiva al lavaggio delle mani

19. Quali interventi sono appropriati in un bambino con crisi epilettica in atto:

- a) somministrare un bicchiere di acqua
- b) assicurare la posizione laterale e verificare la sicurezza dell'ambiente limitrofo
- c) favorire e supportare la deambulazione

20. Che cosa si intende per "bradicardia"?

- a) diminuzione della frequenza cardiaca, con ritmo regolare
- b) dilatazione della pupilla
- c) aumento della frequenza respiratoria, con ritmo regolare, oltre 20 atti respiratori/minuto

21. Quali parametri devono essere valutati con priorità nell'assistenza al paziente con grave politrauma?

- a) Stato delle vie aeree, respirazione e circolazione
- b) Temperatura corporea e livello di idratazione
- c) Presenza di dolore localizzato agli arti

22. Quali parametri neurologici sono valutati attraverso la Glasgow Coma Scale?

- a) Risposta verbale, risposta motoria e apertura degli occhi
- b) Riflessi osteotendinei, tono muscolare e coordinazione
- c) Pressione arteriosa, frequenza cardiaca e frequenza respiratoria

23. Che cosa si intende per tutela della privacy del paziente (D.Lgs. 196/2003 - GDPR (Regolamento UE 2016/679))?

- a) Protezione delle informazioni personali e dei dati sensibili del paziente
- b) Possibilità per i familiari di accedere liberamente alla documentazione clinica
- c) Rispetto della riservatezza del paziente durante le procedure assistenziali

24. Quale segno può indicare un problema respiratorio durante anafilassi?

- a) Respirazione regolare e silenziosa
- b) Orticaria, angioedema, difficoltà respiratoria
- c) Saturazione stabile 99%

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO ED IN-
DETERMINATO DI INFERNIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUN-
ZIONARI**

25. Quali interventi fondamentali devono essere attuati durante le manovre di primo soccorso?

- a) Ignorare la scena e concentrarsi solo sui parametri vitali
- b) Valutazione dello stato di coscienza e del respiro
- c) Mobilizzare il paziente indipendentemente da potenziali traumi

26. Il Codice Deontologico è stato redatto dalla comunità professionale nel:

- a) 2025
- b) 2014
- c) 1925

27. In presenza di quali fattori di rischio del bambino, il vaccino RSV è indicato per una seconda immunizzazione:

- a) bambini nati prematuri < 33 settimane gestazione
- b) bambini in sovrappeso
- c) bambini con piede torto o strabismo congenito

28. Quale intervento infermieristico è prioritario in un neonato con punteggio di Apgar <2 ?

- a) Supporto immediato alle funzioni vitali secondo protocolli neonatali
- b) Coprire il neonato senza ulteriori valutazioni
- c) Documentare il punteggio e attendere che il neonato si stabilizzi spontaneamente

29. Quali aspetti clinici e assistenziali devono essere valutati in un paziente con malattia infiammatoria intestinale?

- a) Frequenza delle evacuazioni, presenza di dolore addominale e stato di idratazione
- b) Preferenze alimentari senza considerare i sintomi
- c) Insomnia e crampi arti inferiori

30. Quale condotta descritta anche nel “Codice di comportamento del dipendente”, costituisce violazione della Legge 190/2012 :

- a) azioni che determinano conflitto di interesse
- b) mancato rispetto dell'orario di lavoro
- c) esprimere giudizi e pregiudizi verso l'assistito