

Standard di qualità

		Peso (%)	MOLTO ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	Vincolo*	Soglia
Area clinica	Indicatore		1	2	3	4	5		
CARDIOCIRCOLATORIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	30	%	≤ 6	6 – 18	8 – 12	12 – 14	> 14	
	IMA STEMI: % trattati con PTCA entro 90 minuti	15	%	≥ 60	50 – 60	40 – 50	20 – 40	< 20	
	Scompenso cardiaco congestivo: mortalità a 30 giorni	10	%	≤ 6	6 – 9	9 – 14	14 – 18	> 18	
	By-pass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni (NV)	20	%	≤ 1.5		1.5 – 4		> 4	Volume di interventi (di BPAC totale) 180 (media biennio)
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	15	%	≤ 1.5		1.5 – 4		> 4	
	Riparazione di aneurisma non rotto dell' aorta addominale: mortalità a 30 giorni	10	%	≤ 1		1 – 3		> 3	
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	75	%	≤ 8	8 – 10	10 – 14	14 – 16	> 16	
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	25	%	≤ 1.5		1.5 – 3.5	3.5 – 5	> 5	
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	100	%	≤ 5	5 – 7	7 – 12	12 – 16	> 16	
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	100	%	≥ 80	70 – 80	60 – 70	50 – 60	< 50	Volume di ricoveri 90
CH. ONCOLOGICA	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	34	%	≤ 5	5 – 8	8 – 12	12 – 18	> 18	Volume di ricoveri 135
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	33	%	≤ 0.5		0.5 – 3		> 3	Volume di ricoveri 85
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	33	%	≤ 1	1 – 3	3 – 6	6 – 8	> 8	Volume di ricoveri 45
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (500≤ vol< 1000)	70	%	≤ 10	10 – 20	20 – 30	30 – 35	> 35	Volume di ricoveri 500
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (vol≥1000)		%	≤ 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	> 35	
	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	15	%	>40	25 – 40	13 – 25	5 – 13	≤ 5	
	Proporzione di episiotomie in parti vaginali	15	%	≤ 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	> 20	
OSTEOMUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48h	60	%	≥ 70	60 – 70	40 – 60	30 – 40	< 30	Volume di ricoveri 65
	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	20	%	≤ 3		3 – 9		> 9	Volume di ricoveri 80
	Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	20	%	≤ 3		3 – 9		> 9	Volume di ricoveri 80
NEFROLOGIA	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	100	%	≤ 8	8 – 10	10 – 20	20 – 30	> 30	Volume di ricoveri 65

*Volume di attività della struttura inferiore alla soglia (tolleranza del 10%) fissata dal Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (DM Salute 70/2015) o desumibile dalla letteratura scientifica.

Ospedale Fatebenefratelli E Oftalmico

Altezza proporzionale al volume di attività



Misura puntuale dell'aderenza

Altezza proporzionale alla validità e rappresentatività dell'indicatore all'interno dell'Area clinica



Indicatore

Min

Larghezza proporzionale alla precisione



Volume di attività inferiore alla soglia (tolleranza del 10%) fissata dal regolamento riguardante la Definizione degli standard ospedalieri (DM Saluta 70/2015) o desumibile dalla letteratura scientifica



Strutture a cui è stato richiesto di avviare una procedura di audit sulla qualità dei dati

AREA CLINICA	INDICATORE		N	% Adj	% Italia	Vol. Attività	Vol. Operatore	Audit
CARDIOCIRCOLATORIO	IMA: mortalità a 30 giorni (con variabili cliniche)		106	6.35	7.13			
	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti		57	40.52	56.14			
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni		157	8.96	9.63			
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni		67	6.04	9.55			
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: ricoveri con degenza post operatoria < a 3 giorni		83	82.79	84.74	127	31	
CH. ONCOLOGICA	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni		57	1.74	3.69	38	8	
OSTEOMUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore		114	59.53	56.27	135	36	
	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni		43	-	3.12	56	21	
NEFROLOGIA	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero		51	6.72	11.47			