

CONSENSO INFORMATO ALL'INTERVENTO DI LEEP

La sottoscritta dichiara di essere stata informata in modo chiaro ed esaurente dal dott./dott.ssa sulla opportunità di sottoporsi ad intervento di LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) .

Tale intervento appartiene all'ambito delle tecniche escissionali , raccomandate dalle linee guida della Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico Vaginale , quale trattamento di elezione delle lesioni intraepiteliali della cervice o CIN.

La tecnica, generalmente effettuata in anestesia locale, prevede l'utilizzo di un generatore elettrochirurgico monopolare, nel quale, la corrente alternata, ad alta frequenza e a basso voltaggio, vaporizza le cellule lungo le linee di escissione ; ciò avviene mediante l'uso di un' ansa diatermica, la cui forma e dimensione meglio si adatta al tipo di lesione.

Il vantaggio della LEEP consiste essenzialmente nell'essere una tecnica notevolmente conservativa dell'anatomia e della funzione della cervice uterina, rispetto ad esempio alla tradizionale conizzazione a lama fredda ; nello stesso tempo è una tecnica sicura perché , essendo una tecnica escissionale , fornisce materiale da sottoporre ad esame istologico , tipicamente un "cono" cervicale in caso di leep conizzazione , diversamente da quanto avviene con le tecniche distruttive , quali la diatermocoagulazione o la laser CO2 vaporizzazione.

Le complicanze dell'intervento di LEEP non sono frequenti e , solitamente di lieve entità.

La più frequente consiste nel sanguinamento intraoperatorio nella sede dell'escissione, che può essere favorito dalla presenza di una infezione cervicovaginale concomitante; più rare le ustioni accidentali delle pareti vaginali imputabili, per lo più , a improvvisi cambiamenti di posizione , a paziente sveglia.

Qualche volta può essere avvertito un lieve bruciore nella sede dell'escissione o un fastidio in sede sovra pubica , del tipo lieve dolore mestruale .

A distanza di 5- 10 giorni dall'intervento, spesso compare una perdita ematica rosso vivo di breve durata , dovuta alla caduta dell'escara, che , solo in rarissimi casi, necessita di terapia .

Al fine di conseguire una adeguata guarigione , sarà opportuno osservare le precauzioni e le eventuali terapie prescritte alla dimissione.

Ciò acquisito, acconsento in piena coscienza all'intervento che mi è stato proposto

Firma della pazientedel medico.....

Data