

## Standard di qualità

							MOLTO ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO		
Area clinica	Indicatore	Peso (%)	1	2	3	4	5	Vincolo*	Soglia				
CARDIOCIRCOLATORIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	30	%	≤ 6	6 – 18	8 – 12	12 – 14	> 14					
	IMA STEMI: % trattati con PTCA entro 90 minuti	15	%	≥ 60	50 – 60	40 – 50	20 – 40	< 20					
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	10	%	≤ 6	6 – 9	9 – 14	14 – 18	> 18					
	By-pass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni (NV)	20	%	≤ 1.5		1.5 – 4		> 4	Volume di interventi (di BPAC totale)	180 (media biennio)			
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	15	%	≤ 1.5		1.5 – 4		> 4					
	Riparazione di aneurisma non rotto dell' aorta addominale: mortalità a 30 giorni	10	%	≤ 1		1 – 3		> 3					
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	75	%	≤ 8	8 – 10	10 – 14	14 – 16	> 16					
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	25	%	≤ 1.5		1.5 – 3.5	3.5 – 5	> 5					
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	100	%	≤ 5	5 – 7	7 – 12	12 – 16	> 16					
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	100	%	≥ 80	70 – 80	60 – 70	50 – 60	< 50	Volume di ricoveri	90			
CH. ONCOLOGICA	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	34	%	≤ 5	5 – 8	8 – 12	12 – 18	> 18	Volume di ricoveri	135			
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	33	%	≤ 0.5		0.5 – 3		> 3	Volume di ricoveri	85			
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	33	%	≤ 1	1 – 3	3 – 6	6 – 8	> 8	Volume di ricoveri	45			
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (500≤ vol< 1000)	70	%	≤ 10	10 – 20	20 – 30	30 – 35	> 35	Volume di ricoveri	500			
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario ( vol≥1000)		%	≤ 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	> 35					
	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	15	%	>40	25 – 40	13 – 25	5 – 13	≤ 5					
	Proporzione di episiotomie in parti vaginali	15	%	≤ 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	> 20					
OSTEOMUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48h	60	%	≥ 70	60 – 70	40 – 60	30 – 40	< 30	Volume di ricoveri	65			
	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	20	%	≤ 3		3 – 9		> 9	Volume di ricoveri	80			
	Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	20	%	≤ 3		3 – 9		> 9	Volume di ricoveri	80			
NEFROLOGIA	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	100	%	≤ 8	8 – 10	10 – 20	20 – 30	> 30	Volume di ricoveri	65			

\*Volume di attività della struttura inferiore alla soglia (tolleranza del 10%) fissata dal Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (DM Salute 70/2015) o desumibile dalla letteratura scientifica.

