Preparazione Entero-Tc entero-RM clisma tenue

A) Pazienti con sospetta occlusione intestinale

Il giorno prima dell'esame:
- ore 8.00: colazione e assunzione di 6 confetti di Pursenid
- ore 14.00: assunzione di 6 confetti di Pursenid
- nelle ore seguenti assumere circa 1.-5 litri di acqua in 3-4 ore 8se non subentra vomito)
- ore 21.00: bere una tazza di brodo magro di carne

B) Tutti altri pazienti
- ore 8.00: colazione

Consigliamo un blando lassativo, a base di Macrogol (COLONPEG) da sciogliere in due buste in 1.5 Litri di acqua
L'assunzione è consigliata verso le 16.00 del giorno precedente l'esame se appuntamento nella mattinata.
Viceversa, se l'esame fosse programmato per il pomeriggio, l'assunzione dovrà avvenire verso le 19.000 della sera precedente.

In particolare, l'assunzione è consigliata verso le ore 16.00 del giorno precedente l'esame, se l'appuntamento sarà nella mattina; viceversa, se l'esame di colonscopia virtuale fosse programmato per il pomeriggio, allora l'assunzione dovrà essere effettuata verso le 19.00 della sera precedente.

- ore 21.00: bere una tazza di brodo magro di carne

Suggeriamo di portare la documentazione medica (ricetta, visite specialistiche, clisma opaco e/o colonscopie precedenti).