

## Standard di qualità

		Peso (%)	MOLTO ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	Vincolo*	Soglia
Area clinica	Indicatore		1	2	3	4	5		
CARDIOCIRCOLATORIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	30	%	≤ 6	6 – 18	8 – 12	12 – 14	> 14	
	IMA STEMI: % trattati con PTCA entro 90 minuti	15	%	≥ 60	50 – 60	40 – 50	20 – 40	< 20	
	Scompenso cardiaco congestivo: mortalità a 30 giorni	10	%	≤ 6	6 – 9	9 – 14	14 – 18	> 18	
	By-pass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni (NV)	20	%	≤ 1.5		1.5 – 4		> 4	Volume di interventi (di BPAC totale) 180 (media biennio)
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	15	%	≤ 1.5		1.5 – 4		> 4	
	Riparazione di aneurisma non rotto dell' aorta addominale: mortalità a 30 giorni	10	%	≤ 1		1 – 3		> 3	
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	75	%	≤ 8	8 – 10	10 – 14	14 – 16	> 16	
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	25	%	≤ 1.5		1.5 – 3.5	3.5 – 5	> 5	
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	100	%	≤ 5	5 – 7	7 – 12	12 – 16	> 16	
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	100	%	≥ 80	70 – 80	60 – 70	50 – 60	< 50	Volume di ricoveri 90
CH. ONCOLOGICA	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	34	%	≤ 5	5 – 8	8 – 12	12 – 18	> 18	Volume di ricoveri 135
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	33	%	≤ 0.5		0.5 – 3		> 3	Volume di ricoveri 85
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	33	%	≤ 1	1 – 3	3 – 6	6 – 8	> 8	Volume di ricoveri 45
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (500≤ vol< 1000)	70	%	≤ 10	10 – 20	20 – 30	30 – 35	> 35	Volume di ricoveri 500
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario ( vol≥1000)		%	≤ 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	> 35	
	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	15	%	>40	25 – 40	13 – 25	5 – 13	≤ 5	
	Proporzione di episiotomie in parti vaginali	15	%	≤ 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	> 20	
OSTEOMUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48h	60	%	≥ 70	60 – 70	40 – 60	30 – 40	< 30	Volume di ricoveri 65
	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	20	%	≤ 3		3 – 9		> 9	Volume di ricoveri 80
	Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	20	%	≤ 3		3 – 9		> 9	Volume di ricoveri 80
NEFROLOGIA	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	100	%	≤ 8	8 – 10	10 – 20	20 – 30	> 30	Volume di ricoveri 65

\*Volume di attività della struttura inferiore alla soglia (tolleranza del 10%) fissata dal Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (DM Salute 70/2015) o desumibile dalla letteratura scientifica.

Altezza proporzionale al volume di attività  
AREA CLINICA



Altezza proporzionale alla validità e rappresentatività dell'indicatore all'interno dell'Area clinica

Indicatore

Min

Larghezza proporzionale alla precisione



Misura puntuale dell'aderenza

Livello di aderenza a standard di qualità

Molto alto (dark green) Alto (medium green) Medio (light green) Basso (orange) Molto basso (red) ND (grey)

Volume di attività inferiore alla soglia (tolleranza del 10%) fissata dal regolamento riguardante la Definizione degli standard ospedalieri (DM Saluta 70/2015) o desumibile dalla letteratura scientifica



Strutture a cui è stato richiesto di avviare una procedura di audit sulla qualità dei dati



AREA CLINICA	INDICATORE		N	% Adj	% Italia	Vol. Attività	Vol. Operatore	Audit
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di partori con taglio cesareo primario		2753	11.57	22.66	3050		75
	Proporzione di partori vaginali in donne con pregresso parto cesareo		244	29.70	11.57	3050		75
	Proporzione di episiotomie nei partori vaginali		2100	2.65	10.54	3050		75