Ospedale "Luigi Sacco" Polo Universitario
ASST Fatebenefratelli Sacco
Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze
(Direttore: f.f. Dr.ssa Alessandra Lombardi)

URINOCOLTURA DA MITTO INTERMEDIO

Le urine possono essere raccolte in contenitore sterile con tappo a vite a bocca larga o nel contenitore dedicato Uriswab

CONTENITORE	RICERCA DI:	CONSERVAZIONE
Contenitore sterile e con tappo a vite a bocca larga	• Batteri comuni e lieviti • Ricerca Micobatteri	Consegnare al Centro prelievi entro 2 ore dalla raccolta o conservare a 4°C sino al momento dell'invio al laboratorio
Uriswab	• Batteri comuni e lieviti	Consegnare al Centro prelievi entro 2 ore dalla raccolta o conservare a 4°C sino al momento dell'invio al laboratorio

INDICAZIONI E MODALITA' DI RACCOLTA

- La raccolta del campione deve avvenire il mattino del giorno della consegna del campione
- PRIMA della raccolta lavare i genitali con acqua e sapone, sciacquare ed asciugare con cura i genitali aprire il contenitore
- Iniziare ad urinare scartando la prima parte del getto di urine
- Raccogliere le urine nel contenitore
- Chiudere il contenitore avvitando bene il tappo
- Non toccare l'interno del contenitore
-
- Identificare con nome e cognome il contenitore

Al momento della consegna al Punto prelievi verrà consegnato un contenitore Uriswab. In questo ultimo caso, procedere al trasferimento del campione di urine come segue.

INDICAZIONI PER UTILIZZO URISWAB

a) Se il campione viene prodotto i estemporanea al centro prelievi: (Procedura 1)

- aprire la provetta. Non toccare il tampone e la spugnetta
- iniziare ad urinare scartando la prima parte del getto ed urinare direttamente sulla spugnetta ,
- inserire il tampone con la spugnetta nella provetta e riavvitare bene il tappo
- non toccare l'interno del contenitore, non inserire urina nella provetta



b) Se il campione è stato raccolto nel contenitore sterile a casa: (Procedura 2)

- aprire la provetta. Non toccare il tampone e la spugnetta.
- inserire il tampone con la spugnetta nella contenitore sterile per 30 sec
- re-inserire il tampone con la spugnetta nella provetta e riavvitare bene il tappo;
  non toccare l'interno del contenitore e non inserire urina nella provetta



: