Vaccinazione anti Herpes Zoster

Offerta della vaccinazione alla popolazione a rischio e per età

L'Herpes Zoster (HZ), conosciuto anche come **fuoco di Sant' Antonio**, è una **patologia comune e debilitante** causata dalla **riattivazione del virus della Varicella Zoster** (VZV), contratto generalmente nel corso dell'infanzia. **Dopo tale infezione**, il virus non viene eliminato ma rimane latente nell'organismo e **può riattivarsi** e manifestarsi in qualsiasi momento , soprattutto negli **anziani ed in chi ha il sistema immunitario debilitato.**

MANIFESTAZIONI CLINICHE

Le manifestazioni cutanee dell'Herpes Zoster prevedono la comparsa di vescicole localizzate molto dolorose. La complicanza più comune è rappresentata dalla nevralgia post-erpetica: una sindrome dolorosa cronica che può durare mesi o, addirittura, anni dopo la guarigione delle lesioni cutanee. Altre complicanze della malattia sono l'herpes zoster oftalmico *(lesioni vicine all'occhio, che possono causare danni alla vista)*, meningite, encefalite e la polmonite.

IL VACCINO

Sono disponibili **due tipi di vaccino** che stimolano il sistema immunitario ad agire specificamente contro il virus : il vaccino ricombinante e il vaccino a virus vivo attenuato.
Entrambi i vaccini sono indicati per la prevenzione dell'Herpes Zoster (HZ) e della Nevralgia post-erpetica (NPE), contribuendo a controllare la riattivazione e la replicazione del virus dentro l'organismo.

La vaccinazione è rivolta alle persone che compiono **65 anni di età** nell'anno dell'offerta in corso e viene estesa anche ai nati nei due anni precedenti *(esempio per l'anno 2022 è offerta per i nati nel 1957, ma estesa anche ai nati nel 1956 e 1955)* **e**, indipendentemente dall'età, alle **persone** di età superiore ai 18 anni **con particolari condizioni di salute** (es. diabete, cardiopatia, BPCO, immunodepressione etc.)

A seconda della tipologia di vaccino sono necessarie una o due dosi.
Tale vaccinazione è in grado di **ridurre in modo significativo i casi di nevralgia post-erpetica e i casi clinici di zoster.**
Il vaccino può essere co-somministrato, in sede anatomiche diverse, insieme al vaccino anti SARS-Cov-2.
Il vaccino non può in alcun modo causare l'Herpes Zoster o la Varicella.

EFFETTI COLLATERALI

Le reazioni avverse più comuni sono dolore, rossore e gonfiore in sede di iniezione, cefalea, dolore muscolare, febbre. Tali reazioni sono in genere di lieve entità. Come ogni altro farmaco, è possibile che la vaccinazione determini una reazione allergica severa, ma questa è un'evenienza molto rara.

Per maggiori informazioni
visita il sito:
www.asst-fbf-sacco.it

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Fatebenefratelli Sacco